

OSASUN PUBLIKOA ETA AMIANTOA AMIANTO Y SALUD PÚBLICA



Iván García Angulo.

Bizkaiko Ingurumenaren Osasun Unitea /

Unidad Sanidad Ambiental Bizkaia

Bizkaiko Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariorde /
Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Bizkaia

Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza / *Departamento de Salud.*


Gobierno Vasco.

NOLA EGIN AMIANTOAREN UDAL-ERROLDAK EAEN
COMO ELABORAR CENSOS MUNICIPALES EN LA CAPV

ivan-garcia@euskadi.eus

Asko erabili da produktu askotan, hala nola eraikuntza-materialetan, marruskadura-produktuetan eta beroari eusten dioten ehungintzako materialak.

60ko hamarkadan, amianto-zuntzen eta mesoteliomaren (ehun bigunetako minbizia) eraginpean egoteak langileengan duen lotura erakusten duten lehen ikerketak argitaratu ziren.




El amianto es peligroso cuando hay exposición a las fibras en degradación (materiales friables: materiales que se desmenuzan, que se rompen). Muchos de los materiales que contienen amianto no son peligrosos hasta 30-35 años desde su fabricación mientras estén íntegros.

El amianto está clasificado como cancerígeno tipo I por el IARC.

Egungo ezagutza-egoeran, amianto-zuntzen eraginpean egoteak, gutxienez, honako gaixotasun hauek eragin ditzake (EBko 2023 Zuzentaraua):

- asbestosia
- mesotelioma
- biriketako minbizia
- urdail-hesteetako minbizia
- laringeko minbizia
- obarioko minbizia
- gaixotasun pleural ez-gaiztoak





Aquellas personas que estuvieron expuestas, conscientes o inconscientemente al amianto, una vez identificadas, son incluidas en los programas de vigilancia de la salud postocupacional.

- ✓ La enfermedad grave tiene un tiempo largo para manifestarse tras la exposición
- ✓ La OMS estima que cada año mueren en el mundo 107.000 personas por la exposición a amianto.
- ✓ La prevalencia de tumores malignos de bronquios y pulmón en Euskadi, con 1,6 casos por 1.000 habitantes, están por encima de la media estatal.

➤ Mesoteliomarekin (amiantoarekiko esposizioari lotutako tumore gaiztoa) lotutako heriotza-tasa nabarmen handitu da gizonetan 2009ra arte, eta, orduetik, moteldu egin da.

➤ 2017-2021 aldian, gizonen heriotza-tasa 2,9koa zen 100.000 gizoneko.

➤ 2017-2021 aldian 158 gizon eta 46 emakume hil dira.

Iturria: Minbizia Euskal Autonomia Erkidegoan 2001-2021. Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

BIZTANLERIA AHULENA / POBLACIÓN VULNERABLE



Una población o grupo vulnerable es aquella que es más propensa que otra a desarrollar problemas de salud, bien porque está expuesta al riesgo o por su pobre condición física, psicológica o social, que hace que sea más sensible a enfermar ⁽¹⁾. En el caso de la exposición al amianto, se considera vulnerable:

- La población infantil, juvenil
- La población con enfermedades crónicas o con patologías susceptibles de agravarse
- La población residente en centros sociosanitarios y centros penitenciarios.

Aday LA. Health Status of Vulnerable Populations. Annu Rev Public Health. 1994; 15(1):487–509.

Eraikinak:

- ✓ Ikastetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak.
- ✓ Osasun zentroak (Ospitaleak, klinikak, anbulategiak).
- ✓ Kirol zentroak
- ✓ Espetxeak



EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

ONDORIOAK

- ✓ Kezka dago eraikinetako amianto-zuntzen degradazioarekiko esposizioak eragina izan dezakeelako edo datozen urteetan tumoreak ager daitezkeelako.
- ✓ Europako Batzordeak uste du 500.000 pertsona hil direla datozen urteetan amiantoaren ondorioz.
- ✓ **Horregatik, gida honetan gomendatutako ekintzak urrats garrantzitsua eta beharrezkoa dira prebentzioan.**
- ✓ Bat datoz 2030erako Euskadiko Osasun Planaren helburuekin:
 - ❖ 2. helburua: Osasuna hobetzea eta hilkortasuna murriztea
 - ❖ 6. helburua: ingurune eta komunitate osasungarriak, jasangarriak eta erresilienteak sortzea eta garatzea, eta klima-aldaketari erantzutea

- ✓ *Hay preocupación por la posibilidad que la exposición a la degradación de las fibras de amianto en edificios puedan ser factores contribuyentes o causa de aparición de tumores en los próximos años.*
- ✓ *La Comisión Europea estima 500.000 muertes debidas al amianto en los próximos años.*
- ✓ ***Por eso las acciones recomendadas en esta guía son un paso importante y necesario en la prevención.***
- ✓ *Alineadas con los objetivos del Plan de Salud de Euskadi 2030:*
 - ❖ *Objetivo 2: Mejorar la salud y reducir la morbimortalidad*
 - ❖ *Objetivo 6: Crear y desarrollar entornos y comunidades saludables, sostenibles y resilientes y responder al cambio climático*